




Programm / Programme

XII. Schweizer Impfkongress 2023

XII^e Congrès Suisse de Vaccination 2023

Congress Center Basel

9. – 10. November 2023

www.impfkongress.ch

Willkommen

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Im Namen des wissenschaftlichen Komitees freuen wir uns, Sie zur Teilnahme am XII. Schweizerischen Impfkongress einzuladen, der vom 9. bis 10. November 2023 in Basel, Schweiz, stattfinden wird.

Eingebettet im Herzen Europas, im Dreiländereck zwischen der Schweiz, Deutschland und Frankreich, ist Basel eine Metropole im Taschenformat, die sprichwörtliche Schweizer Qualität mit einer multikulturellen Bevölkerung verbindet. Das macht die Stadt unverwechselbar weltoffen und innovativ. Die Stadt glänzt mit allerlei Kultur. Knapp 40 Museen mit ihren traditionsreichen Sammlungen und spektakulären Sonderausstellungen begründen den Ruf Basels als Kunst- und Museumsstadt. Basel hat eine lange akademische Tradition mit der ältesten Universität der Schweiz (gegründet 1460) und ist Sitz von weltweit führenden Pharmaunternehmen.

Seit dem letzten Schweizerischen Impfkongress im Oktober 2021 haben sich verschiedene wichtige Neuerungen in der Vakzinologie ergeben, die wir Ihnen alle vorstellen werden. Kompetente Referentinnen und Referenten, verschiedene Präsentationsformen (Vorträge, interaktive Sessions, Workshops) und genügend Zeit zum Diskutieren sind die Eckdaten dieses interessanten und lohnenden Kongresses. Die begleitende Industrierausstellung bietet Ihnen die Möglichkeit, mit Experten aus der Branche ins Gespräch zu kommen. Das Hauptziel bleibt die umfassende, offene und ehrliche Information über den aktuellen Stand der Impfungen.

Wir hoffen, dass Sie die Tagung geniessen werden.



Prof. Dr. Ulrich Heininger
Kongresspräsident



Prof. Dr. Urs B. Schaad
Kongresspräsident

Bienvenue

Chères collègues,

Au nom du comité scientifique, nous sommes heureux de vous inviter à participer au XII^e Congrès Suisse de Vaccination qui aura lieu du 9 au 10 novembre 2023 à Bâle, en Suisse.

Nichée au cœur de l'Europe, à la croisée des chemins entre la Suisse, l'Allemagne et la France, Bâle est une métropole en format de poche, combinant la qualité suisse proverbiale avec une population multiculturelle. Cela rend la ville distinctement cosmopolite et innovante. La ville brille de mille feux culturels. Près de 40 musées, avec leurs collections riches en traditions et leurs expositions temporaires spectaculaires, confirment la réputation de Bâle en tant que ville d'art et de musées. Bâle a une longue tradition académique avec la plus ancienne université de Suisse (fondée en 1460) et abrite des entreprises pharmaceutiques de premier plan à l'échelle mondiale.

Depuis le dernier Congrès Suisse de Vaccination en octobre 2021, de nombreuses innovations importantes sont survenues dans le domaine de la vaccinologie que nous vous présenterons toutes. Des conférencières et conférenciers compétents, diverses formes de présentation (conférences, sessions interactives, ateliers) et suffisamment de temps pour la discussion sont les points forts de ce congrès intéressant et enrichissant. L'exposition industrielle qui l'accompagne vous offre l'opportunité de dialoguer avec des experts du secteur. L'objectif principal reste l'information complète, ouverte et honnête sur l'état actuel des vaccinations.

Nous espérons que vous apprécierez le congrès.



Prof. Dr. Ulrich Heininger
Président du congrès



Prof. Dr. Urs B. Schaad
Président du congrès

NEU
AB JUNI 2023 VERFÜGBAR

MenQuadfi®

DER NEUE MENINGOKOKKEN ACWY-IMPfstoff VON SANOFI

Indiziert zur **aktiven Immunisierung von Personen ab 12 Monaten** gegen eine invasive Meningokokken-Erkrankung hervorgerufen durch *Neisseria meningitidis* der Serogruppen A, C, W und Y.¹

Ohne Rekonstitution: gebrauchsfertige Injektionslösung in einer Durchstechflasche.¹

Hohe Immunantworten gegenüber den Serogruppen A, C, W und Y in allen getesteten Altersgruppen und Serogruppen.¹

Überlegene Immunantwort gegen Serogruppe C bei Kleinkindern (12–23 Monate).^{2*}

*Im Vergleich zu MenC-TT (NeisVac-C)³

Referenzen

1. Fachinformation MenQuadfi®, Stand der Information: Juni 2022. Siehe unter www.swissmedinfo.ch. 2. Knuf M, et al. Comparing the meningococcal serogroup C immune response elicited by a tetanus toxoid conjugate quadrivalent meningococcal vaccine (MenACYW-TT) versus a quadrivalent or monovalent C tetanus toxoid conjugate meningococcal vaccine in healthy meningococcal vaccine-naïve toddlers: A randomised, controlled trial. Hum Vaccin Immunother. 2022 Nov 30;18(5):2052657. 3. Fachinformation NeisVac-C. Stand der Information: Februar 2020. Siehe unter www.swissmedinfo.ch.

Fachpersonen können die Referenzen beim Unternehmen anfragen.

Gekürzte Fachinformation

MenQuadfi®: W: Polysaccharide von *Neisseria meningitidis* der Gruppen A, C, W-135 und Y, konjugiert an Tetanus-Toxoid-Trägerprotein. I: Immunisierung von Personen ab 12 Monaten gegen eine invasive Meningokokken-Erkrankung hervorgerufen durch *Neisseria meningitidis* der Serogruppen A, C, W und Y. D: Eine Dosis bei Personen ab 12 Monaten als Grundimmunisierung oder Auffrischimpfung. K: Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile des Impfstoffes oder eines Impfstoffes mit den gleichen Inhaltsstoffen. VM: Nicht subkutan, intravaskulär oder intradermal injizieren. Synkope (Ohnmacht) kann auftreten. IA: Bei gleichzeitiger Anwendung anderer Arzneimittel stets Injektionsstellen an unterschiedlichen Gliedmassen wählen und unterschiedliche Spritzen verwenden. NW: Personen von 12 bis 23 Monaten: Benommenheit, Erbrechen, Diarrhö, Reizbarkeit, Appetitlosigkeit, anomales Weinen, Reaktionen an der Einstichstelle (Druckschmerz/Schmerz, Erythem, Schwellung), Fieber. Personen ab 2 Jahren: Kopfschmerzen, Myalgie, Reaktionen an der Einstichstelle (Schwellung, Erythem, Schmerzen) Schmerzen an der Injektionsstelle, Unwohlsein, Fieber. P: Packung mit 1 oder 5 Einzeldosis-Durchstechflaschen (0,5 ml). AK: B. Zul.-Inh: sanofi-aventis (schweiz) ag, 1214 Vernier/GE. Stand der Information: Juni 2022. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Fachinformation unter www.swissmedinfo.ch.

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Für weitere Informationen siehe Fachinformation MenQuadfi® auf www.swissmedinfo.ch.



Jetzt auch im Sanofi Vaccines Online Shop
bestellen unter www.sanofivaccineshop.ch



sanofi-aventis (schweiz) ag, Route de Montfleury 3, 1214 Vernier
Tel.: +41 (0)58 440 21 00, Fax: +41 (0)58 440 35 20, www.sanofi.ch

sanofi

Wissenschaftliches Komitee / Comité scientifique

Kongresspräsidenten / Présidents du congrès

Prof. Dr. Ulrich Heininger, Basel
Prof. Dr. Urs B. Schaad, Basel

Wissenschaftliches Komitee / Comité scientifique

Prof. Dr. Christoph Aebi, Bern
Prof. Dr. Werner Albrich, St. Gallen
PD Dr. Christoph T. Berger, Basel
Prof. Christoph Berger, Zürich
Dr. Pierre-Alex Crisinel, Lausanne
Dr. Daniel Desgrandchamps, Zug
Dr. Alessandro Diana, Genève

Prof. Ulrich Heininger, Basel
Dr. Stephen Jenkinson, Bern
Dr. Anita Niederer-Loher, St. Gallen
Prof. Urs. B. Schaad, Basel
Dr. Anne Spaar, Bern
Dr. Susanne Stronski Huwiler, Bern

Akkreditierung / Accréditation

Das wissenschaftliche Programm ist durch die folgenden Gesellschaften anerkannt:
Le programme scientifique est reconnu par les sociétés suivantes:

Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere Medizin (SGAIM) <i>Société Suisse de Médecine Interne Générale (SSMIG)</i>	12 Credits
Schweizerische Gesellschaft für Allergologie und Immunologie (SGAI) <i>Société Suisse d'Allergologie et d'Immunologie (SSAI)</i>	8 Credits
Schweizerische Gesellschaft für Infektiologie (SGNIF) <i>Société Suisse d'Infectiologie (SSI)</i>	12 Credits
Schweizerische Gesellschaft für Arbeitsmedizin (SGARM) <i>Société Suisse de Médecine du Travail (SSMT)</i>	13 Credits
FPH Offizin*	50 FPH Credits

*Nach dem Kongress müssen wir alle Teilnehmer, die an den FPH-Credits interessiert sind, auf die Plattform hochladen. Bitte teilen Sie uns daher nach dem Kongress per E-Mail folgende Daten mit: Vorname, Nachname, FPH-Nummer / Après le congrès, nous avons besoin de télécharger tous les participants intéressés par les crédits FPH sur la plateforme. Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir nous communiquer après le congrès par e-mail les informations suivantes : nom, prénom, numéro FPH.

Tagesübersicht / Tableau journalier

Donnerstag, 9. November 2023 / Jeudi 9 novembre 2023				
	Montreal	Nairobi	Rio	Mexico
08.30				
09.00	09.00 Öffnung des Kongress-Sekretariat / <i>Ouverture du secrétariat</i>			
09.30				
10.00				
10.30	09.45 <i>Begrüßung / Mot de bienvenue</i>			
11.00				
11.30	10.00 – 11.40 Symposium			
12.00				
12.30	11.40 – 12.00 Kaffeepause / <i>Pause-café</i> 			
13.00				
13.30	13.00 – 14.00 Mittagspause / <i>Pause déjeuner</i> 			
14.00				
14.30				
15.00	15.00 – 16.00 Vortrag / <i>Présentation</i>	14.00 – 15.00 Workshop 1		
15.30		14.00 – 15.00 Atelier 2		
16.00	16.00 – 16.15 Kaffeepause / <i>Pause-café</i> 			
16.30	16.15 – 17.00 Vortrag / <i>Présentation</i>	14.00 – 15.00 Workshop 3		
17.00				
17.30	17.00 – 17.30 Vortrag / <i>Présentation</i>			
18.00				

Tagesübersicht / Tableau journalier

Donnerstag, 9. November 2023 / Jeudi 9 novembre 2023			Freitag, 10. November 2023 / Vendredi 10 novembre 2023
Hongkong	Samarkand	Guangzhou	Montreal
			08.00 – 08.30 Öffnung des Kongress-Sekretariats / Ouverture du secrétariat et de l'exposition
			08.30 – 09.45 Symposium
			09.45 – 10.30 Vortrag / Présentation
			10.30 – 11.00 Kaffeepause / Pause-café ☕
			11.00 – 12.00 Symposium
			12.00 – 12.45 Vortrag / Présentation
			12.45 – 13.45 Mittagspause / Pause déjeuner 🍴
			13.45 – 15.15 Symposium
			15.15 – 15.45 Kaffeepause / Pause-café ☕
			15.45 – 17.45 Symposium
			17.15 – 17.30 Verabschiedung
			17.30 Endes des Kongresses

09.00	Öffnung des Kongress-Sekretariats / Ouverture du secrétariat
09.45	Begrüssung / Mot de bienvenue <i>Urs B. Schaad, Ulrich Heiningner</i>
10.00	SYMPOSIUM Impfen in der Schweiz – wo stehen wir? Von der Herstellung bis zur Verimpfung <i>Input-Referat mit Anne Spaar (BAG)</i> Podiumsdiskussion mit: <i>Christoph Berger (Vertreter EKIF)</i> <i>Stefan Otto (Vertreter BAG)</i> <i>Christoph Küng (Vertreter Swissmedic)</i> <i>Sabine Bruckner (Vertreterin Interpharma)</i> <i>Stephen Jenkinson (Vertreter Grundversorgung Apotheke)</i> <i>Heidi Zinggeler Fuhrer (Vertreterin Grundversorgung Ärzteschaft)</i> SNV : Où en sommes-nous après la pandémie et où va-t-on ? <i>Input-Referat mit Céline Gardiol</i> Konkretes Projekt-Beispiel: E-VACTS (Electronic VACcine Training Switzerland) mit Nino Künzli & Jorgen Bauwens (SSPH+) Fragen & Diskussionsrunde
11.40	Kaffeepause / Pause-café ☕
12.00	WORKSHOPS Runde 1 / ATELIERS 1
13.00	Lunch in der Industrieausstellung / Lunch dans l'exposition 
14.00	WORKSHOPS Runde 2 / ATELIERS 2
15.00	Old diseases coming back: Diphtherie und Poliomyelitis <i>Vortrag: Christoph Aebi, Céline Gardiol</i>
16.00	Kaffeepause / Pause-café ☕
16.15	Nachholimpfungen in der Apotheke – Chancen und Herausforderungen <i>Vortrag: Florian Sarkar</i>
17.00	Update EKIF-recommendations 2023 and outlook for 2024 (Pneumococcus, Meningococcus, COVID-19) <i>Vortrag: Christoph Berger (ZH)</i>

08.00	Öffnung des Kongress-Sekretariats / Ouverture du secrétariat
08.30	SYMPOSIUM Auswirkungen von COVID auf andere Infektionskrankheiten (Influenza, RSV, ...) <i>Richard Neher, Christoph Aebi, Werner Albrich</i>
09.45	Wann und wie soll man Impfschutz messen? <i>Vortrag: Werner Albrich, Christoph Berger (BS)</i>
10.30	Kaffeepause / Pause-café ☕
11.00	SYMPOSIUM Neue Impfstoffe: Influenza, RSV, COVID-19 <i>Christiane Eberhardt</i>
12.00	INFOVAC Fellows: Spannende Fälle <i>Nora Fritschi, Anita Uka</i>
12.45	Mittagspause 
13.45	SYMPOSIUM Reisemedizin Malaria und Dengue – impfpräventabel? – <i>Marcel Tanner</i> Impfberatung für Reisende 2023 – <i>Alexia Anagnostopoulos</i>
15.15	Kaffeepause / Pause-café ☕
15.45	SYMPOSIUM Neue Impfstoffe und neue Technologien Pipeline: neue Impfstofftechnologien – <i>Arnaud Didierlaurent</i> Circadian rhythm and vaccination – <i>Jeff Haspel</i> Impfprävention von Diabetes mellitus – <i>Annette Ziegler</i>
17.15	Verabschiedung
17.30	Ende des Kongresses

12.00 – 13.00

Workshop 1 | Raum/Salle: Nairobi**Vaccination among young people – The influence of social media and what we can do about it***Susanne Stronski, Suzanne Suggs***Workshop 2** | Raum/Salle: Rio**Varizellen- und Herpes Zoster-Impfungen – Umsetzung im Praxisalltag!***Daniel Desgrandchamps, Pierre-Alex Crisinel***Atelier 3** | Raum/Salle: Mexico**Procédure pratique en cas de suspicion d'effets secondaires d'un vaccin***Christoph Berger (BS), Yannick Müller***Workshop 4** | Raum/Salle: Hongkong**Reiseimpfungen bei Kindern und Jugendlichen – Praktische Beispiele***Anita Niederer Loher, Noémie Wagner***Atelier 5** | Raum/Salle: Samarkand**Comment s'adresser à nos patients vaccino-hésitants?***Alessandro Diana, Philip Tarr***Workshop 6** | Raum/Salle: Guangzhou**Komplexe Impfsituationen (Onkologie, fehlender Impfausweis ...)***Geraldine Blanchard, Christiane Eberhardt*

14.00 – 15.00

Workshop 1 | Raum/Salle: Nairobi**Impfung bei Jugendlichen:****Der Einfluss der sozialen Medien und was wir dagegen tun können***Susanne Stronski, Suzanne Suggs***Atelier 2** | Raum/Salle: Rio**Vaccination contre la varicelle et le zona – mise en œuvre dans la pratique quotidienne !***Daniel Desgrandchamps, Pierre-Alex Crisinel***Workshop 3** | Raum/Salle: Mexico**Praktisches Vorgehen bei Verdacht von Impfnebenwirkung***Christoph Berger (BS), Yannick Müller***Atelier 4** | Raum/Salle: Hongkong**Vaccinations de voyage pour les enfants et les jeunes – exemples pratiques***Anita Niederer Loher, Noémie Wagner***Workshop 5** | Raum/Salle: Samarkand**Wie sprechen wir unsere impfscheuen Patienten an?***Alessandro Diana, Philip Tarr***Atelier 6** | Raum/Salle: Guangzhou**Situations complexes en matière de vaccination (oncologie, absence de certificat de vaccination ...)***Geraldine Blanchard, Christiane Eberhardt*



NUVAXOVID™

Dispersion for injection



Recommended as a booster by the Federal Office of Public Health (FOPH) and the Commission Fédérale pour les Vaccinations (CFV; Federal Vaccination Commission)¹ - Indicated regardless of primary vaccination²

- The only protein-based COVID-19 vaccine authorized in Switzerland, prepared according to established manufacturing processes¹
- Efficacy demonstrated in two Phase 3 studies^{3,4,5}:
 - 90.4%* and 89.7%** vaccine efficacy, respectively
 - 100% protection against severe disease progression and hospitalization shown from post-hoc analyses^{4,5,6}
 - Long-term data show continued efficacy of 82.7%*** at a maximum of 7.5 months (median 4.5 months).
- Good tolerability profile²
- Ease of application⁷:
 - Ready for use
 - Same dosage for all authorised uses
 - Can be stored in the refrigerator between 2°C and 8°C (36°F and 46°F) for up to 9 months

1. Federal Office of Public Health (FOPH), Federal Vaccination Commission (CFV). https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/mt/k-und-i/aktuelle-ausbrueche-pandemien/2019-nCoV/covid-19-impfempfehlung-herbst-2022.pdf.download.pdf/Covid-19-Impfempfehlung_BAG_EKIF_DE.pdf. Please refer to actual recommendations. | 2. Nuvaxovid® prescribing information (January 2023). See www.swissmedinfo.ch. | 3. Heath PT et al., Safety and Efficacy of NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine. N Engl J Med 2021; 385: 1172-1183 | 4. Heath PT et al., Safety and Efficacy of NVX-CoV2373 Coronavirus Disease 2019 Vaccine at Completion of the Placebo-Controlled Phase of Randomized Controlled Trial. Clin Infect Dis. 2022; 76(3): 398-407 | 5. Dunkle LM et al., Efficacy and Safety of NVX-CoV2373 in Adults in the United States and Mexico. N Engl J Med. 2021; 386:531-543 | 6. Marchese AM et al., NVX-CoV2373 vaccine efficacy against hospitalization: A post hoc analysis of the PREVENT-19 phase 3, randomized, placebo-controlled trial. Vaccine 2023, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X2300467X> | 7. Federal Office of Public Health, <https://www.infovac.ch/docs/public/coronavirus/bag/automne2022/steckbrief-covid19impfstoffe-de.pdf> (accessed 15 May 2023) | * 95% confidence interval [CI], 82.9 to 94.6 | ** 95% confidence interval [CI], 80.2 to 94.6 | *** 95% confidence interval [CI], 73.3 to 88.8

References provided upon request.

▼ This medicinal product is subject to additional monitoring. For further information, see the prescribing information for Nuvaxovid® at www.swissmedinfo.ch

Nuvaxovid®, Dispersion for injection.

Composition: 5 µg SARS-CoV-2 spike protein per 0.5 mL dose. Excipients: Fraction A and C of *Quillaja-saponaria* Molina extract, cholesterol, phosphatidylcholine (including tocopherol), potassium dihydrogen phosphate, potassium chloride, disodium hydrogen phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium chloride, polysorbate 80, sodium hydroxide, hydrochloric acid and water for injection. t-**INDICATIONS:** Active immunization to prevent COVID-19 caused by SARS-CoV-2 in individuals 12 years of age and older. **DOSAGE:** Nuvaxovid is administered intramuscularly as a course of 2 doses of 0.5 mL each in individuals 12 years of age and older. It is recommended to administer the second dose 3 weeks after the first dose. Nuvaxovid (0.5 mL) can be administered around 6 months after the second primary vaccination dose of Nuvaxovid in individuals 18 years of age and older, as a homologous or heterologous booster dose. **CONTRAINDICATIONS:** Hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients.

PRECAUTIONS: Cases of anaphylaxis have been reported. A second dose of the vaccine should not be administered to those who have had an anaphylactic reaction to the first dose. Very rare cases of myocarditis and pericarditis have been reported. Anxiety-related reactions, including vasovagal reactions (syncope), hyperventilation or stress-related reactions in association with vaccination. Vaccination should be postponed in individuals with an acute, severe febrile illness or acute infection. Caution is required in individuals receiving anticoagulation therapy or those with thrombocytopenia or any coagulation disorder (such as hemophilia). Vaccinated individuals may not be fully protected until 7 days after their second dose. **INTERACTIONS:** The binding antibody response to SARS-CoV-2 is lower when Nuvaxovid is given concomitantly with an inactivated influenza vaccine. Concomitant administration of Nuvaxovid with other vaccines has not been studied. **ADVERSE DRUG REACTIONS:** Very common: Headache, nausea, vomiting, myalgia, arthralgia, injection site tenderness, injection site pain, fatigue, malaise. Common: Injection site redness, injection site swelling, fever, chills, extremity pain. **PREGNANCY/LACTATION:** Administration of Nuvaxovid in pregnancy should only be considered when the potential benefits outweigh any potential risks. It is unknown whether Nuvaxovid is excreted in human milk. **PACKAGING:** Packs of 10 multidose vials. Each vial contains 10 doses of 0.5 mL. **List B. Marketing Authorization Holder:** Future Health Pharma GmbH, 8620 Wetzikon.

Manufacturer: Novavax CZ, Czech Republic. The complete prescribing information is available at www.swissmedinfo.ch. **Date:** January 2023.



Liste der Referenten/innen und Moderatoren/innen

Liste des orateurs/oratrices et modérateurs/modératrices

Aebi	Christoph	Bern
Albrich	Werner	St. Gallen
Anagnostopoulos	Alexia	Zürich
Bauwens	Jorgen	Zürich
Berger	Christoph	Zürich
Berger	Christoph	Basel
Blanchard	Géraldine	Genève
Bruckner	Sabine	Basel
Crisinel	Pierre Alex	Lausanne
Desgrandchamps	Daniel	Zug
Diana	Alessandro	Genève
Didierlaurent	Arnaud	Genève
Dziekan	Gerald	Bern
Eberhardt	Christiane	Genève
Fritschi	Nora	Basel
Gardioli	Céline	Bern
Haspel	Jeff	Washington
Heininger	Ulrich	Basel
Jenkinson	Stephen	Bern
Küng	Christoph	Bern
Künzli	Nino	Basel
Müller	Yannick	Lausanne
Neher	Richard	Basel
Niederer-Loher	Anita	St. Gallen
Otto	Stefan	Bern
Sarkar	Florian	Balsthal
Schaad	Urs. B.	Basel
Spaar	Anne	Bern
Stronski	Susanne	Bern
Suggs	Suzanne	Lugano
Tanner	Marcel	Basel
Tarr	Philip	Basel
Uka	Anita	Lausanne
Wagner	Noémie	Genève
Ziegler	Annette Gabriele	München
Zinggeler Fuhrer	Heidi	Chur

Sponsoren / Sponsors

Wir danken allen Sponsoren und Ausstellern für die grosszügige Unterstützung:
Nous remercions les sponsors et les exposants pour le généreux soutien :

AstraZeneca

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Bundesamt für Gesundheit BAG

BAVARIAN NORDIC

CSL Vifor

GSK

HCI Solutions

MSD

NOBITE®

novavax

moderna

Pfizer



sanofi

Ausstellerliste und Ausstellungsplan /

Liste des exposants et plan de l'exposition

AstraZeneca
BAG
Bavarian Nordic
CSL Vifor
GlaxoSmithKline
HCI Solutions
Moderna
MSD Merck Sharp & Dohme AG
Nobite
Novavax
Pfizer AG
Sanofi

Übersichtsplan / Plan des lieux





SHINGRIX
(ZOSTER VACCINE
RECOMBINANT, ADJUVANTED)

**SHINGRIX IST EMPFOHLEN
DURCH BAG/EKIF & RÜCKVERGÜTET^{1,2,†}**

GÜRTELROSE MUSS NICHT SEIN – WORAUF WARTEN SIE?

SHINGRIX.
Bis zu 97% Wirksamkeit.³
Langanhaltender Schutz.⁴



Erfahren Sie hier mehr
über SHINGRIX und
die Co-Administration



gskpro.com

Shingrix (Herpes-Zoster-Impfstoff, rekombinant, adjuvantiert). **W:** Varicella-Zoster-Virus-Glykoprotein E (gE-Antigen). **I:** Prävention von Herpes Zoster (HZ) bei Erwachsenen im Alter von 50 Jahren und älter und bei Erwachsenen im Alter von 18 Jahren und älter mit erhöhtem HZ-Risiko. **D:** Übliche Dosierung: Grundimmunisierung: Zwei Dosen (je 0,5 ml), Abstand mind. 2 Monate. Spezifische Dosierung: siehe Fachinformation. Intramuskulär in den *M. deltoideus*. Zur Notwendigkeit von Auffrischimpfungen liegen keine Daten vor. **KI:** Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe. **W/V:** Shingrix kann möglicherweise nicht bei allen Geimpften eine schützende Immunantwort erzielen. **IA:** Shingrix kann gleichzeitig mit einem nicht-adjuvantierten, saisonalen Grippeimpfstoff, PPV23 Impfstoff, PCV13 Impfstoff oder dTpa Impfstoff verabreicht werden. Die Impfstoffe stets an unterschiedlichen Stellen injizieren. **S/S:** Keine klinischen Daten zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorhanden. **UW:** *Sehr häufig:* Kopfschmerzen, gastro-intestinale Beschwerden (einschliesslich Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und/oder Bauchschmerzen), Myalgie, Reaktionen an der Injektionsstelle (Schmerzen, Rötung, Schwellung), Müdigkeit, Schüttelfrost, Fieber. *Häufig:* Pruritus an der Injektionsstelle, Unwohlsein. *Gelegentlich:* Lymphadenopathie, Schwindel, Arthralgie. *Post-Marketing-Erfahrung:* *Selten:* Überempfindlichkeitsreaktionen. *Sehr selten:* Guillain-Barré-Syndrom. *Unbekannt:* schwerwie-

gende Hauttoxizität. **Lag:** Im Kühlschrank (2–8°C). **P:** Durchstechflasche mit Pulver und Durchstechflasche mit Suspension, *1. **AK:** **B. Stand der Information:** März 2023. GlaxoSmithKline AG, 3053 Münchenbuchsee. Ausführliche Angaben finden Sie unter www.swissmedinfo.ch. Unerwünschte Arzneimittelwirkungen melden Sie bitte unter pv.swiss@gsk.com. Fachpersonen können die genannten Referenzen bei GlaxoSmithKline AG anfordern.

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Für weitere Informationen, siehe Fachinformation Shingrix auf www.swissmedinfo.ch.

Referenzen: 1. Bundesamt für Gesundheit (BAG), Eidgenössische Kommission für Impffragen (EKIF). Neue Empfehlungen zur Impfung gegen Herpes zoster: Impfstoff Shingrix®, BAG Bulletin, 2021;47: 8–15. 2. Spezialitätenliste BAG, www.spezialitätenliste.ch, zugegriffen im Februar 2023. 3. Shingrix Fachinformation, www.swissmedinfo.ch, zugegriffen im Juni 2023. 4. Strezova A, et al. Long-term Protection Against Herpes Zoster by the Adjuvanted Recombinant Zoster Vaccine: Interim Efficacy, Immunogenicity, and Safety Results up to 10 Years After Initial Vaccination. Open Forum Infectious Diseases, Volume 9, Issue 10, October 2022, ofac485, <https://doi.org/10.1093/ofid/ofac485>.

† mit Limitatio

Die Grippe-Impfung steht an!

**Aber was ist
mit Herpes-Zoster?**

Auch die Herpes-Zoster-Impfung gehört für Ihre immunkompetenten Patient:innen über 65 Jahre zur Vorsorge dazu.¹

Die Grippe-Impftermine sind ein idealer Zeitpunkt, um mit ihnen darüber zu sprechen.

Erwägen Sie, bei Ihren Patient:innen SHINGRIX gleichzeitig mit einem nicht-adjuvantierten, saisonalen Grippeimpfstoff, zu verabreichen.³

**Sprechen Sie Ihre
Patient:innen jetzt aktiv auf
die Gürtelrose-Impfung an.**